

Tabell för utspädning av Virkon® S / Virkon® S -liuoksen valmistus

Nödvändig volym av lösning med desinfektionsmedel	Utspädningsgrad / Laimennusaste	
	1:100 (1%)	1:200 (0.5%)
Mängd av Virkon® S att tillföra / Virkon® Lisättävä määrä		
10 liter / litraa	100g	50g
20 liter / litraa	200g	100g
50 liter / litraa	500g	250g
100 liter / litraa	1kg	500g
200 liter / litraa	2kg	1kg

1. Mät upp lämplig mängd av Virkon® S -pulver för att uppnå önskad utspädningsgrad.
2. Blanda Virkon® S -pulvert i vattnet och rör om grundligt tills det syns att pulvert har lösts upp.

OBIS: En kopp som innehåller ungefärlt 200g Virkon® S -pulver finns med i förpackningen.

1. Mittaa tarvittava määrä Virkon® S -jauhetta saadaksesi halutun laimennussuhteen.

2. Lisää Virkon® S -jauhetta veteeseen ja sekoita kunnolla, kunnes se on liuenettu.

HUOM: Pakkausen mukana toimitetaan kuppi, johon mahtuu noin 200 g Virkon® S-jauhetta.

Första hjälpen: Allmänt råd: Ge aldrig nägonting genom munnen till en medvetlös person. Sök läkarhjälp om symptomen inte försvinner eller alltid når tivsel föreligger. **Inhandling:** Flytta bort personen från exponeringsområdet, lägg ner. Om personen har slutat andas kan konstgjord andning och/eller syre vara nödvändigt. Konsultera en läkare. **Hudkontakt:** Skölj omedelbart med en riktig mängd vatten. Konsultera en läkare. **Ögonkontakt:** Ta bort kontaktlinser. Skölj omedelbart med en riktig mängd vatten och konsultera en läkare. **Intagning:** Framkalla INTE kräckning. Om personen är vid medvetande: drick en riktig mängd vatten. Tillskalla en läkare omedelbart.

Ensiapu: Yleisiä neuvoja: Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Jos oireet jatkuvat tai jos sinulla on epäilyksiä, käännä lääkärin puoleen. **Hengitys:** Poista uhri altistumisalueelta ja laita makkuulle. **Jos uhri ei hengitä:** Voi alla tarpeen antaa teohengitystä ja/tai hapea. Käännä lääkärin puoleen. **Ihokontakti:** Pese heti runsaalla vedellä. Käännä lääkärin puoleen. **Silmäkontakti:** Poista piilolaist. Huuhtele heti runsaalla vedellä ja käännä lääkärin puoleen.

Nielemieni: ÄLÄ oksennuta. Jos potilas on tajuissaan, juota hänen runsaasti vettä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.



Virkon® S pulver
Verksamma biocidämnen: Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat) vid 497 g/kg
Innehåller Dikaliumperoxodisulfat. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
• Irriterar huden • Risk för allvarliga ögonskador • Skadligt för vattenlevande organismer • Förvaras påkombigt för barn • Undvik inandning av damm • Undvik kontakt med huden och ögonen • Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare • Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd • Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten • Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

Virkon® S -jauhe
Valmisteen sisältämä tehoaine: Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat), 497 g/kg
Sisältää Dikaliumperoxodisulfat. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
• Ärsyttää ihoa • Vakavan silmäaurion varaus • Haitallista vesiliöille • Säilytettävä lasten ulottumattomissa • Välttää pölyn hengittämistä • Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin
• Roiskeet silmistä huhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkärin • Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvonsuojaista • Jos ainetta on nietylty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti • Tämä aine ja sen pakkaus on käsitteltävä ongelmajätteenä.

Distributör/Maahantuaja:
Pharmaxim AB
Stenbrogången 32, 253 68 Helsingborg
Tel. 042-38 54 50
Giftinformationscentralen: +46-(0)8-331231

Pharmaxim AB
Apilaatu 10, 20740 Turku
Puh. 02 2437 600
Myrktykeskus puh. 09 471977

A01449562/VirkonS/Pharm.Swe/Fm/22.08.17



Virkon® S

EFFEKTIVT DESINFektionsmedel MED BRETT SPEKTRUM
TEHOKAS LAAJAKIRJOINEN DESINFektioaine

SE Dokumenterad effektiv mot virus, bakterier och svampar

Effektivt på porösa ytor, i hårt vatten, vid låga temperaturer och med organiska ämnen

Idealiskt för desinfektion av djurställar, ytor, utrustning och vattenledningssystem samt luftdesinfektion

FI Dokumentoitut teho viruksia, bakteereita ja sieniä vastaan

Tehokas huokoisilla pinnoilla, kovassa vedessä, alhaisissa lämpötiloissa ja orgaanisen aineksen yhteydessä

Ihanteellinen karjasuojen, pintojen, laitteiden, ajoneuvojen, vesijärjestelmien ja ilmatilan desinfiointiin

Tillverkare/Valmistaja:

Antec International Limited - A DuPont Company
Windham Road, Chilton Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk CO10 2XD England
Tel: +44 (0) 1787 377305 Fax: +44 (0) 1787 310846
E-mail: disinfectants.emea@dupont.com
Web: www.virkon.com
Giftinformationscentralen +46-(0)8-331231
Myrktykeskus puh. 09 471977

FI

Käyttö: Virkon® S' oma laajan vaikutusspektrin, sen käyttötarvallisuusprofiili ja monikäyttöisyyss tekevät sitä parhaan vaihtoehdon karjasuojen, pintojen, laitteiden, ajoneuvojen, jalkahuutelujen, vedenjäkelijäristelmiin ja ruiskutuksen avulla tehtävään desinfiointiin.

KÄYTTOÖHJEET

Käyttö	Laimennusaste	Käyttö
Pintojen rutiinidesinfiointi	1:100 (1%)	Käytä painepesuria tai muuta mekanista ruiskua ja levitä Virkon® S liuosta, käyttömäärällä 200ml/m ² .
Liikkuvien laitteiden rutiini desinfiointi	1:100 (1%)	Ruiskuta Virkon® S liuosta käyttömäärällä 200ml/m ² .
Jalka-altaan ja ajoneuvojen pyörähuuhtelut	1:100 (1%)	Vaihda liuos, kun se on tullut likaiseksi tai 4 - 5 päivän käyttöjakson jälkeen.
Vesijärjestelmät (loppudesinfiointi)	1:100 (1%)	Eristä pääsäiliö verkosta ja juoksuta tyhjäksi juomapistestä, jotka ovat kaikkein etämmällä säiliöstä. Puhdistaa iost jätteet ja lika. Täytä vedellä ja lisää sopiva määrä Virkon® S -jauhetta, sekoita hyvin ja anna vaikuttaa 10 minuuttia. Huuhtele järjestelmä kokonaan kaikissa juoksutuspisteissä ja anna vaikuttaa vielä 50 minuuttia, ennen kuin tyhjennät järjestelmä ja täytä sen uudelleen puhtaalla vedellä.
Vesijärjestelmä (jatkuva desinfiointi)	1:1000 (0,1%)	Annostelee pääsäiliöön sopiva määrä Virkon® S -jauhetta. Ota yhteys DuPont -yhtiöön saadaksesi täsmällisiä ohjeita.
Sumutus/ Ilmaruiskutusdesinfiointi	1:200 (0,5%)	Käytä joko painepesuria tai reppusumutinta kaikkein hienoimmalla pisarakoolla ja suihkuta 1 litra Virkon® S liuosta kohti 10m ² lattia/pinta-alaa.

Kaikilla mulla laimennuspitoisuuskäytöillä (jota ei näy taulukossa) tai saadaksesi neuvoja lämpösuumutuskäytöistä, ota yhteys Pharmaximiin tai DuPont -yhtiöön.

HUOM: Pintojen ja laitteiden desinfioimiseksi on kontaktiajan oltava 30 minuuttia. Desinfiointiaineen käyttötihys riippuu kunkin kohteen bioturvaliusvaatimuksista. Ota yhteys Pharmaximiin tai DuPont -yhtiöön lisätietojen saamiseksi.

VAROITUKSIA: • Käytä desinfiointiaineita turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä • Säilytä viileässä paikassa kansi tiukasti kiinni • Laita kansi aina takaisin käytön jälkeen, jos tuoteta säilytetään pidemmän aikaa • Huuhtele astia vedellä käytön jälkeen ja heitä se pois asianmukaisella tavalla (heitä jäljelle jäänyt jauhe & sisempi pussi pois ongelmajätteenä) • Älä anna liivisten tai liuosten päästä suoraan vesiväylin • Älä sekoita muuhin kuin valmistajan suosittelemaan kemikaaleihin • Jos on oletettavissa, että kontakti metallipintojen kanssa jatku pitkään, aine on huuhdeltava puhtaalla vedellä • Huuhtele levitysvälineet käytön jälkeen • Suojaamatonta henkilöitä ei saa päästä käsittelytavalle alueelle, ennen kuin suihkutussumu on hävinnyt.

Vain ammattikäytöön

Copyright© 2011 DuPont eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehålls. DuPonts ovals logotyp, DuPont™, The miracles of science™ och Virkon® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DuPont eller dess dotterbolag.